

症状	疗程	施作时间	疗程		施作间隔	备注
		(分钟)	平均	最高		
丰胸		30	4周	24周	1次/日	配合五谷丰胸法
粉刺		6	9周	24周	2~7次/周	副作用: 1.短暂红斑及浮肿(1~24小时内消失)。 2.患者10%有色素沈著(6周内消失)
皱纹		6~12	8周	NA	2~3次/周	
皱纹预防治疗		6	预防治疗		1~2次/周	
妊娠纹		6	8周	NA	2~3次/周	
肥胖纹		6	8周	NA	2~3次/周	
疤痕		6~12	8周	NA	2~3次/周	
老人斑		6	4周	NA	2~3次/周	淡化; 无法完全消除
黑斑		6	4周	NA	2~3次/周	淡化
秃头症		6	6周	NA	2次/周	
急慢性关节 软组织损伤	腕、踝、 指、趾关节	30	12次	20次	1次/日	针对痛点治疗
	肘、膝关节	60	12次	20次	1次/日	
关节炎(类风湿性、感染性等)		60	12次	20次	1次/日	
单纯疱疹		1	4次	NA	2次/日	早晚各1次
带状疱疹		30~60	10次		1次/日	带状疱疹所引起的神经痛
局部淋巴结肿大		6	10次		1次/日	适用于鼠蹊部
湿疹		6	10次		2~3次/周	
伤口及皮肤治疗 (局部烧 烫伤、刺伤、手术创伤、 糖尿病引起的溃烂)		3	5~10次		1~3次/日	第1阶段
		6	5~10次		1~3次/日	第1阶段(3日後无改善)
		1~3	20次		1次/隔日	第2阶段

